



Вакцинация от ...	Возраст	Кому	Пояснения
Дифтерия, столбняк	С 18 лет	Привитым в детстве: ревакцинация каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.	<p>В качестве ревакцинации вводится одна доза.</p> <p>Если с момента последней ревакцинации прошло более 10 лет, то возобновление курса не требуется.</p> <p>Если курс был начат, но не завершен - продолжить.</p> <p>Если взрослый ранее не прививался от дифтерии и столбняка, то он должен сделать первичный курс вакцинации: две дозы с интервалом не менее 1 месяца, + ревакцинация через 9-12 месяцев. Далее ревакцинации 1 раз в три года</p> <p>Бесплатно: вакцина АДС М.</p> <p>Платно: вакцина Адасель.</p>
Гепатит В	с 18 до 55 лет	Не привитые ранее	<p>Профилактическая вакцинация людям не из группы риска проводится по схеме 0 1 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 доза в момент начала вакцинации • 2 доза через месяц после 1 прививки • 3 доза через 6 месяцев от начала вакцинации <p>Если курс был начат, но незавершен доделать недостающие дозы. Возобновлять курс заново с начала не требуется.</p> <p>Если взрослый не прививался от гепатита В ранее, статус вакцинации не известен или курс вакцинации был прерван сдайте анализы на гепатит В (HBsAg , anti HBsAg, anti HBcAg)</p> <p>Вакцинация в возрасте 55+ также возможна, только за свой счет.</p>
Краснуха	с 18 до 25 лет (включительно)	Вакцинация и/или ревакцинация проводится женщинам, которые не болели, не привиты, привиты однократно, не имеют сведений о прививках против краснухи Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев	Вакцинация в более старшем возрасте также возможна, только за свой счет
Корь	с 18 до 35 лет (включительно)	Не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори; Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев	Вакцинация в более старшем возрасте также возможна, только за свой счет

Корь	с 36 до 55 лет (включительно)	<p>Лица, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, относящиеся к группам риска работники:</p> <ul style="list-style-type: none"> • медицинских организаций • образовательных организаций • торговли • транспорта • организаций коммунальной сферы • организаций социальной сферы • лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации <p>Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев</p>	Вакцинация в более старшем возрасте также возможна, только за свой счет
Грипп	с 18 лет	<ul style="list-style-type: none"> • обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; • работающие по отдельным профессиям и должностям: <ul style="list-style-type: none"> • работники медицинских организаций • образовательных организаций • транспорта • коммунальной сферы • сферы предоставления услуг • работающие вахтовым методом • сотрудники правоохранительных органов • государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу • лица, подлежащие призыву на военную службу • работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров • государственные гражданские и муниципальные служащие • лица старше 60 лет • лица с хроническими заболеваниями, в том числе <ul style="list-style-type: none"> • с заболеваниями легких, сердечно сосудистыми • заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением • беременные женщины 	 

Запись на вакцинацию

- позвоните нам: +7 473 2000 451
- или запишитесь у администратора в любом филиале “Здорового ребенка”

@ZR_MEDICAL

MCZR_MED